

## Wiedergulassung nach Erkrankungen

Bei folgenden Erkrankungen ist ein schriftliches Attest über die Wiedergulassung bei <u>ausdrücklicher Aufforderung des Personals</u> erforderlich:	Bei folgenden Erkrankungen ist ein schriftliches Attest über die Wiedergulassung <u>zwingend</u> erforderlich:
<b>Magen- Darmerkrankungen</b> Nach Abklingen der Symptome (24 h nach dem ersten festen Stuhlgang bzw. nach dem letzten Erbrechen) Sollten im Krümelhaus innerhalb von 14 Tagen mehr als 15% der Personen im Haus erkrankt sein, so verlängert sich die Pause auf 48 h.	<b>Keuchhusten (Pertussis)</b> Wichtig ist eine Mitteilung darüber, ab wann der Patient nicht mehr ansteckend ist.
<b>Windpocken</b> Bei unkompliziertem Verlauf 7 Tage nach den ersten Bläschen	<b>Infektiöse Gastroenteritis</b> §34 Abs. 1 Satz 3 bestimmt, dass Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind, die Gemeinschaftseinrichtung nicht besuchen dürfen, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Erkrankung nicht mehr zu befürchten ist.
<b>Scharlach (Streptokokken)</b> Nach 3 Tagen mit antibiotischer Behandlung und ohne Krankheitszeichen. Ohne antibiotischer Behandlung nach 3 Wochen	<b>Kopflausbefall</b> Nissenfrei <u>oder Attest</u> , dass Nissen lebensunfähig. Auf jeden Fall nach dem zweiten Auftreten innerhalb von 14 Tagen.
<b>Masern</b> Nach Abklingen der Symptome, frühestens 5 Tage nach Ausbruch der Krankheit.	<b>Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)</b>
<b>Mumps</b> Nach Abklingen der Symptome, frühestens 9 Tage nach Auftreten der Parotischwellung	<b>Scabies (Krätze)</b>
<b>Röteln</b> Nach Abklingen der Symptome, frühestens 7 Tage nach dem ersten Ausschlag. Kontaktpersonen dürfen die Einrichtung besuchen, wenn sie zwei Lebendimpfungen erhalten haben oder die letzte Lebendimpfung nicht „älter“ als 4 Wochen ist.	<b>Enteritis durch enterhämorrhische E-Coli (EHEC)</b>
<b>Salmonellen</b> 2 Tage nach Abklingen des Durchfalls	<b>Paratyphus / Typhus abdominalis</b>
<b>Virushepatitis A oder B</b> 2 Wochen nach Auftreten der ersten Symptome	<b>Cholera</b>
<b>Mundfäule (Mund-, Hand-, Fußkrankheit)</b>	<b>Diphtherie</b>
<b>Ringelröteln</b>	<b>Virale hämorrhag. Fieber (VHF)</b>
<b>Fieber</b> 24 h nach letztem Auftreten (1 Tag fieberfrei Zuhause!)	<b>Lungen-TBC (infektiös)</b>
<b>Dellwarzen</b> Mit Pflaster abgedeckt, solange sie nicht offen sind oder bluten.	<b>Pest</b>
<b>Herpes</b> Sobald Kruste abgeheilt und abgefallen ist	<b>Polio</b>
<b>Schnupfen</b> Sobald es kein grünlich/gelber zäher Schleim ist	<b>Shigellose, Ruhr</b>
	<b>Covid 19 (Corona)</b>